

**O TRATAMENTO DAS
PESSOAS COM IST
MELHORA A QUALIDADE
DE VIDA E INTERROMPE A
CADEIA DE TRANSMISSÃO
DESSAS INFECÇÕES.**

- O SUS disponibiliza gratuitamente o teste de HIV, sífilis e das hepatites B e C.
- Procure uma unidade básica de saúde da rede pública ou os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).

- Os exames podem ser feitos de forma anônima nos CTA.
- Além da coleta e da execução dos testes, há um processo de aconselhamento.
- Também é possível saber onde fazer o teste pelo Disque Saúde (136).



ORGANIZAÇÃO

**Juracy Rocha da Silva
Luma Sousa Dias
Caylanne Seixas Viana**

**Acadêmicas de Estética e
Cosméticos pela Universidade
da Amazônia.
Acadêmica de Enfermagem**



REALIZAÇÃO



Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde. Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST. Brasília: [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/ist>. Acesso em: 1 nov. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI). Cartilha Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Teresina-PI: UFPI, maio 2020. Disponível em: https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/prex/publicacoes-da-extensao/Cartilha_Infeccoes_Sexualmente_Transmissiveis_IST_com_pressed20200610132403.pdf. Acesso em: 29 ago. 2023.

**Saúde sexual e
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis**



As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, com uma estimativa de 376 milhões de casos novos por ano (OMS, 2019).

QUAIS AS CAUSAS DAS IST?

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) caracterizam-se por infecções causadas por mais de 30 agentes etiológicos diferentes (bactérias, vírus, fungos e protozoários).


São transmitidas, principalmente, por contato sexual. Eventualmente, também podem ser transmitidas por contato sanguíneo, e da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação., esperma e secreções vaginais.

SINTOMAS

As manifestações mais frequentes são feridas, corrimentos, bolhas, verrugas, dor pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumento de ínguas.

As IST aparecem, principalmente, no órgão genital, mas podem surgir também em outras partes do corpo (ex.: palma das mãos, olhos, língua).

O QUE FACILITA A TRANSMISSÃO:



Não utilização de preservativos (camisinha);



Ferimentos que sangram em locais de contato sexual;



Demora em buscar apoio médico caso tenha algum sintoma ou após ter relações desprotegidas.

PRINCIPAIS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS:

- Herpes genital;
- Cancro mole (cancroide)
- HPV
- Doença Inflamatória Pélvica (DIP)
- Donovanose
- Gonorreia e infecção por Clamídia
- Linfogranuloma venéreo (LGV)
- Sífilis
- Infecção pelo HTLV
- Tricomoníase

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico das IST é feito principalmente por meio da anamnese, da identificação das diferentes vulnerabilidades e do exame físico da pessoa (BRASIL, 2022).