



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
SERVIÇO DE AMBULATÓRIO – SETOR DE UROLOGIA
TERAPIA INTRAVESICAL COM GENCITABINA

NOME: _____

PRONTUÁRIO: _____ DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____

SESSÃO	DATA	RESPONSÁVEL
1º INDUÇÃO	____/____/____	
2º INDUÇÃO	____/____/____	
3º INDUÇÃO	____/____/____	
4º INDUÇÃO	____/____/____	
5º INDUÇÃO	____/____/____	
6º INDUÇÃO	____/____/____	
1º MANUTENÇÃO	____/____/____	
2º MANUTENÇÃO	____/____/____	
3º MANUTENÇÃO	____/____/____	
4º MANUTENÇÃO	____/____/____	
5º MANUTENÇÃO	____/____/____	
6º MANUTENÇÃO	____/____/____	
7º MANUTENÇÃO	____/____/____	
8º MANUTENÇÃO	____/____/____	
9º MANUTENÇÃO	____/____/____	
10º MANUTENÇÃO	____/____/____	
11º MANUTENÇÃO	____/____/____	
12º MANUTENÇÃO	____/____/____	



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
SERVIÇO DE AMBULATÓRIO – SETOR DE UROLOGIA
TERAPIA INTRAVESICAL COM GENCITABINA

ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES EM TERAPIA INTRAVESICAL

FASE DE INDUÇÃO: ocorre durante seis semanas consecutivas. O medicamento é administrado diretamente na bexiga por meio de uma sonda, permitindo aplicação rápida e precisa. Após a instilação, é necessário manter a medicação na bexiga por, no mínimo, 60 minutos, realizando mudança de posição a cada 15 minutos, para garantir a distribuição adequada do medicamento. Ao final do período, o paciente poderá esvaziar a bexiga, preferencialmente urinando sentado e mantendo a tampa do vaso sanitário fechada ao dar a descarga, evitando a dispersão de aerossóis da quimioterapia no ambiente.

FASE DE MANUTENÇÃO: inicia-se seis semanas após a conclusão da indução e consiste na administração do medicamento uma vez por mês, durante aproximadamente 12 meses. Os cuidados permanecem os mesmos, incluindo retenção mínima de 60 minutos e mudança de posição durante a aplicação. Antes de cada nova sessão, é obrigatório realizar exames de sangue, pois a dose e o intervalo da quimioterapia podem ser ajustados conforme os resultados e avaliação individual do médico oncologista.

CUIDADOS GERAIS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO:

- Após utilizar o banheiro, recomenda-se puxar a descarga de 2 a 3 vezes com a tampa fechada e lavar bem as mãos com água e sabão, mantendo esses cuidados por 48 horas após a aplicação.
- A hidratação adequada é fundamental, sendo recomendado consumir pelo menos 2 litros de água por dia, especialmente no dia da aplicação e nos dois dias seguintes, para reduzir toxicidades e proteger a função renal.
- Exercícios físicos são encorajados, mesmo durante períodos de fadiga, pois ajudam na qualidade do sono, reduzem a fadiga e melhoram o estado mental, sempre respeitando as orientações da equipe multiprofissional.
- Informar outros profissionais de saúde, como médicos e dentistas, sobre o tratamento em curso antes de iniciar qualquer novo procedimento.

SINAIS E SINTOMAS QUE REQUEREM ATENÇÃO:

- Dor ao urinar nas primeiras 2 a 4 horas após a aplicação, podendo durar alguns dias. Caso o desconforto se prolongue, procurar atendimento.
- Pequeno sangramento ao urinar devido à passagem da sonda; se persistir ou for intenso, buscar atendimento imediato.
- Febre igual ou superior a 37,8°C deve ser comunicada imediatamente, procurando o pronto atendimento.

Sempre que houver dúvidas ou surgirem sintomas, o paciente e os familiares devem entrar em contato com a equipe médica e multiprofissional, garantindo segurança e suporte contínuo durante todo o tratamento.