

# PREVENÇÃO DE ERROS MEDICAMENTOSOS COM SUPORTE VISUAL NO PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA OESTE DE BOA VISTA- RR

Autores: Glenda Ramá Oliveira da Luz, Gleidilene Freitas da Silva, Ana Júlia Azevedo Silva  
André dos Santos Rosa

## Saiba mais sobre a SEGURANÇA DO PACIENTE



### EPIS/HIGIENE



AVENTAL



MÁSCARA



ÓCULOS



TOUCA



LUVAS

- Antes de qualquer procedimento, **higienize corretamente as mãos** com água e sabão ou preparação alcoólica.
- Utilize EPIs conforme o risco: luvas, máscara, avental e óculos de proteção.
- Fazer a antisepsia dos equipamentos regularmente



### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS



Sempre verifique interações medicamentosas potenciais, especialmente em **pacientes com múltiplas prescrições**.



interações podem provocar **efeitos adversos** graves, **perda de eficácia** ou **toxicidade**.



Em caso de dúvida, comunique imediatamente a **equipe multiprofissional**



### IMPORTANTE


#### DILUIÇÃO E RECONSTITUIÇÃO

Misturas incorretas na hora da reconstituição e diluição podem causar reações adversas ou inativar o fármaco.

Utilize exclusivamente o diluente indicado em bula: cloreto de sódio 0,9%, água destilada ou diluentes próprios fornecidos pelo fabricante.

### VIAS DE ADMINISTRAÇÃO (IM)


#### Região Dorsoglútea



#### Região Ventroglútea



#### Vasto Lateral da Coxa



### LEMBRE

agulha a 90°, firme e profunda no músculo.



### NÃO COMETA ESSES ERROS!!!

| ERROS COMUNS                                                   | FORMA CORRETA                                                                         | OBSERVAÇÕES                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzetacil via EV                                              | Benzetacil via IM (profunda)                                                          | Exclusivamente por via IM                                                                   |
| Misturar Tenoxicam e Dipirona na mesma seringa ou mesmo frasco | Administrar cada medicamento separadamente, com lavagem da via com SF 0,9% entre eles | A administração conjunta causa incompatibilidade e compromete a estabilidade das medicações |
| Reconstituição com diluente errado                             | Usar diluente prescrito (ex: SF 0,9%, AD ou o fornecido pelo fabricante)              | Confirmar na bula e com farmacêutico quando necessário                                      |
| Aplicar no mesmo local (IM) repetidamente                      | Alternar locais de aplicação (dorso- glúteo, ventroglúteo e vasto lateral da coxa)    | Previne dor, inflamação, fibrose e abscessos.                                               |