

NOVEMBRO ROXO

Mês de conscientização sobre a prematuridade



O que é o novembro roxo ?

O Novembro Roxo é o mês internacional de sensibilização à prematuridade.

O parto deve ocorrer entre 37 e 42 semanas de gestação completando o 9º mês.

Sendo assim, o que antecede isso é considerado um nascimento prematuro. A prematuridade pode ser classificada em:

> PREMATURIDADE EXTREMA
22-28 SEMANAS
(6-7 MESES)

> PREMATURIDADE SEVERA
28-32 SEMANAS
(7-8 MESES)

> PREMATURIDADE MODERADA
TARDIA 32-37 SEMANAS
(8 MESES)

CAUSAS

Álcool <

Drogas <

Tabagismo <

> Infecções sexualmente transmissíveis;

> NÃO adesão ao Pré-Natal;

Hipertensão <

Diabetes <

Infecções <



1 em cada 10 bebês nasce prematuro no mundo(10%)



No Brasil 11,5% dos bebês nascem prematuros;



•Nascem 340.000 prematuros por ano no brasil



O brasil é o 10° país no ranking mundial da prematuridade



A prematuridade é a principal causa de mortes antes dos 5 anos de idade



Anualmente 1 milhão de bebês morrem em decorrência do parto prematuro

Cuidados com o bebê prematuro em casa

Quando o bebê prematuro recebe alta hospitalar, muitas vezes os pais se sentem ansiosos e inseguros por assumirem a responsabilidade de cuidar dele sem a presença da equipe saúde. Mas, com algumas dicas, é possível acomodar o pequeno em casa sem se descuidar da saúde dele.

Cuidados com a amamentação do prematuro:

Estímulo: Acorde o bebê prematuro um pouco antes da hora dele amamentar e roce o seio ao lado da boca dele.

Esforço: Veja se o bebê está se esforçando muito para mamar. Se precisar é só parar, deixar ele descansar e recomeçar.

Posição: Mantenha o prematuro de pernas encolhidas, os braços voltados para o centro do corpo e a cabeça levemente inclinada em direção ao peito.

Frequência: Depende de quantas vezes o prematuro pede para mamar, mas, varia entre 8 a 12 vezes no dia.

Esses são alguns dos cuidados a serem realizados.

ACADÊMICOS DO 9º E 10º
SEMESTRE DE ENFERMAGEM

Leidiane Nascimento
Rafael Marques
Thayná Magalhães
Willy Rayne Moraes

Docente: Thais Pereira

Fonte: Ministério da Saúde