


LEMBRE-SE

-Esse tratamento **é seguro e eficaz**, e tem como objetivo **evitar que o câncer volte**.


- **Não falte às sessões**: a regularidade é fundamental para o sucesso do tratamento.

-Sempre informe à equipe de enfermagem ou ao médico **qualquer sintoma diferente** que sentir.



TRATAMENTO COM GENCITABINA: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O que é e para que serve?



ELABORADO POR: KAYLLANE CRUZ E
MACÉLY GERVÁSIO
ORIENTAÇÃO: KATERINE MORAES,
GEILSA SORAIA, ÉRICA BRANDÃO
PRECEPTORA: GABRIELA MOTA

REFERÊNCIAS

EVIQ. Bladder intravesical gemcitabine. Disponível em: <https://www.eviq.org.au>. Acesso em: 15 out. 2025.

EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY NURSES (EAUN). Intravesical instillation guideline. 2015. Disponível em: <https://nurses.uroweb.org>. Acesso em: 15 out. 2025.

GONÇALVES, A. F. et al. Estudo prospectivo em pacientes com carcinoma urotelial de bexiga não músculo-invasivo com gemcitabina intravesical. In: 16º Congresso Internacional de Uro-Oncologia, 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br>. Acesso em: 15 out. 2025.

JONES, G. et al. Intravesical gemcitabine for non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC): a systematic review and meta-analysis. Cochrane Database Syst. Rev., 2012. DOI: 10.1002/14651858.CD009294.pub2.

UNIVERSITY HEALTH NETWORK (UHN). Gemcitabine bladder therapy. Toronto: UHN, 2021. Disponível em: <https://www.uhn.ca>. Acesso em: 15 out. 2025.



O QUE É GENCITABINA?



A Gencitabina age diretamente nas células do tecido da bexiga, ajudando a impedir que o câncer volte ou cresça. Como o remédio age localmente, quase não vai para o resto do corpo, o que faz com que os efeitos colaterais sejam menores

COMO É FEITO O TRATAMENTO:



- Fase de indução: 1 vez por semana, por 6 semanas
- Fase de manutenção: pode ser feita mensalmente por 6 a 12 meses, dependendo do protocolo e resposta



O protocolo é seguido conforme orientação médica

GUIDADOS ANTES DA APLICAÇÃO

Vá ao banheiro e **urine antes do procedimento**, pois o tratamento é feito com a bexiga vazia.




Evite **beber muito líquido nas 2 a 3 horas antes da aplicação.**

Você pode **comer normalmente** no dia do tratamento.



Avise a equipe de saúde se estiver usando **anticoagulantes, antibióticos ou anti-inflamatórios**, ou qualquer outro medicamento.

Tome o diurético **depois do tratamento**, se ele estiver marcado para o período da manhã. Se o tratamento for à tarde, tome o diurético **de manhã cedo**.



Evite ter relação sexual nas 24 horas anteriores ao tratamento, para reduzir o risco de irritação ou infecção

DURANTE A APLICAÇÃO

-O medicamento é colocado dentro da sua bexiga **por meio de uma sonda bem fina**, que é introduzida pela uretra (canal por onde sai a urina).

-A aplicação é **rápida e indolor**, pode causar apenas um pequeno incômodo durante a introdução da sonda.



CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO

- Segure a urina por 1 a 2 horas após o tratamento.
- Mude de posição a cada 15 minutos (de costas, de lado e de bruços).
- Ao urinar, sente-se no vaso sanitário e dê duas descargas com a tampa fechada.

- Lave bem as mãos e os genitais com água e sabão.
- Se a urina tocar a pele, lave imediatamente ou tome banho.
- Beba bastante água (2 a 3 litros por dia).
- Evite relações sexuais por 24 horas.

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS

- Ardor ao urinar
- Vontade de urinar várias vezes
- Pequena quantidade de sangue na urina
- Desconforto ou cólica leve na bexiga

⌚ Esses sintomas costumam durar 1 a 2 dias e melhoram sozinhos.



Se você tiver **febre, dor forte, sangue em excesso na urina ou dificuldade para urinar**, avise seu médico ou vá ao pronto atendimento.

QUANDO O TRATAMENTO DEVE SER ADIADO?

- Infecção urinária (ardência, dor ou desconforto ao urinar).
- Sangue na urina, mesmo em pequena quantidade.
- Gravidez ou amamentação.
- Febre, calafrios ou mal-estar.
- Dor, ardência, corrimento ou cheiro forte na urina.
- Cirurgia ou procedimento recente na bexiga.

