

5 CUIDADOS

Atitudes que fazem diferenca e salvam vidas

****Atraso Diagnóstico****

Os sintomas do IAM podem ser atípicos, especialmente em mulheres, idosos e diabéticos. Esse atraso pode ocorrer devido à falta de reconhecimento dos sintomas ou falha na interpretação do eletrocardiograma (ECG) inicial.

ECG em ate 10 minutos

Cuidado com Isordil x Viagra

****Falha na Administração de Medicamentos Adequados****

A não administração ou administração tardia de medicamentos essenciais, como aspirina, anticoagulantes ou inibidores da ECA, pode comprometer o resultado do tratamento

****Subutilização de Terapia Reperfusional****

A Terapia de Reperusão como a angioplastia coronariana ou a trombólise pode ocorrer devido a diagnóstico tardio ou a falta de recursos adequados >> nesse caso entre em contato com SAMU-Ce

Reperusão >> Tempo é miocárdio

Risco de PCR em Fibrilação Ventricular

****Monitoramento Inadequado****

Falta de monitoramento contínuo e adequado dos sinais vitais e do ECG pode levar à falha na detecção de complicações precoces, como arritmias graves, que exigem intervenção imediata.

****Comunicação Ineficiente****

Comunicação deficiente entre os membros da equipe médica e entre diferentes unidades (por exemplo, entre emergência e cardiologia) pode resultar em atraso no tratamento, erros de medicação ou perda de informações críticas sobre o estado do paciente

Piora hemodinamica pode ser despercebida