



Administração de medicamentos por via intramuscular na região ventroglútea



Evidências científicas mostram que a região ventroglútea é a mais adequada e segura para administração intramuscular de medicamentos por ter pouca inervação e vascularização, ser de fácil delimitação e causar menos dor que outras regiões.

Passo a passo

01

Lave as mãos com água e sabonete líquido antes do preparo do medicamento e realize fricção antisséptica das mãos com álcool a 70% antes de administrá-lo.



02

Antes de administrar o medicamento, pergunte o nome completo do paciente e confirme-o com, no mínimo, dois identificadores como data de nascimento e número do prontuário.

03



Para delimitar a região ventroglútea deve-se espalmar a mão não dominante sobre o trocânter maior do fêmur do paciente; O dedo indicador é posicionado sobre a espinha ilíaca ântero-superior, e o dedo médio é posicionado sobre a crista ilíaca, formando um V. O ponto de aplicação é o centro do triângulo formado pelos dedos.



Aplicação

04

Faça a antisepsia com algodão umedecido em álcool a 70%; Insira a agulha no local em ângulo de 90°, realize a aspiração e a medicação. Descarte o material, higienize as mãos e faça o registro da medicação.

ELABORAÇÃO

Mestranda: Mayara Pryscilla S. Silva

Orientadores: Dr. Lucyo W. Torres de Carvalho e Dra. Almira Alves dos Santos