



EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO

Cuidados com o **Catéter Vesical de Demora (CVD)** em casa:

- Manter a bolsa sempre abaixo da cintura, evitando que encoste no chão. Ao deitar, prender em lateral da cama. Ao andar, segurar com as mãos abaixo do nível da cintura;
- É importante que a sonda esteja fixada com esparadrapo em região inguinal (homens) ou face interna da coxa (mulheres);
- Em caso de movimentação da bolsa acima do nível da bexiga, clampar o catéter e descampilar assim que a bolsa retornar ao nível recomendado;
- Esvazie sempre que a bolsa estiver com aproximadamente 1300ml:
 1. Lave as mãos com água e sabão antes e após o manuseio da bolsa coletora;
 2. Caso necessário por recomendações médicas, anote o volume da urina;
 3. Abra a válvula de drenagem e despeje a urina em vaso sanitário, evitando que a válvula encoste no vaso;
 4. Feche a válvula de drenagem;
 5. Limpe e seque a parte do catéter exposta;
 6. Repetir quando necessário.
- Realize higiene com água e sabão neutro na região perineal pelo menos 3x ao dia;
- Cuidado ao movimentar-se para que não ocorra a tração do catéter, levando a uma lesão na uretra.



Atenção!

- Comunique ao médico caso a urina apresente pus, grumos, coágulos ou sangue;
- Retorne ao hospital caso:
 - Apresente febre ou mal estar geral;
 - Apresente aumento no volume da bexiga à palpação;
 - Diminuição considerável do volume da urina;
 - Caso o catéter se desconecte da bolsa coletora;
- A retirada ou troca da CVD só é realizada pela equipe de saúde mediante orientação médica.

