


Você sabia?



Mulheres que **fumam** têm **maior chance de ter câncer do colo do útero**, pois o fumo facilita a infecção pelo HPV.



O vírus do HPV **pode ser transmitido** pelo **contato íntimo**, mesmo **sem penetração**.



A camisinha ajuda a reduzir a transmissão do HPV, mas não oferece proteção total.

Por isso, vacine-se! E use sempre camisinha!



O **exame preventivo** é indicado para mulheres entre **25 e 64 anos** que **já tiveram atividade sexual**.



Após os **64 anos**, o exame pode ser **suspenso** se os **dois últimos resultados** forem **normais**. Mas ainda é importante comparecer as consultas ginecológicas.

Março Lilás: Prevenir hoje é cuidar do seu futuro!

Para mais informações, acesse o Qr Code abaixo:



Equipe

Professora
Samantha Teixeira

Preceptora
Paloma Caldas

Alunos:
Alexandre Motta
Karine Melo
Mariana Silva
Tatiana Felix

Referência: BRASIL. Ministério da Saúde **Março Lilás: mês de prevenção ao câncer de colo de útero**. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/ibc/pt-br/assuntos/noticias/marco-lilas-mes-de-prevencao-ao-cancer-de-colo-de-utero>>. Acesso em: 19 mar. 2026.




Policlínica Regional de Itaipu



**Informação protege,
prevenção salva!**

O que é câncer de colo de útero?

É um tumor (multiplicação anormal das células) que se desenvolve na parte inferior do útero, chamada “colo”, que fica no fundo da vagina.



Colo do útero saudável

Colo do útero com pólipos

Colo com câncer



Colo do útero inflamado

Colo do útero com câncer *in situ*

Colo do útero com câncer avançado

O que causa?

A infecção pelo vírus HPV (Papiloma Vírus Humano), é transmitido na relação sexual.

Como prevenir o câncer de colo de útero?

- Por meio da **vacinação** contra o **HPV**, antes do início da vida sexual
- Do exame preventivo (**Papanicolau**)
- O uso do **preservativo** (camisinha) contribui para reduzir a transmissão do HPV.

O que é o exame preventivo?

É o exame que identifica possíveis lesões causadas pelo HPV. É colhido material do colo do útero e enviado para análise no laboratório.



Quem deve se vacinar contra HPV?



Meninas e meninos de 9 a 14 anos, pois a proteção nesses grupos é maior do que em adultos.

A **vacina** e o **exame** preventivo estão disponíveis na unidade básica de saúde **próxima** de sua casa.

E o que as mulheres podem sentir?

No **início**, as mulheres **não sentem nada**. Mais tarde, podem aparecer sintomas como:



Sangramentos fora do período menstrual



Corrimentos



Dor