

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DO ESCORPIONISMO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA



Tityus obscurus



Tityus silvestris



Tityus strandi

CLASSIFICAÇÃO	MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
LEVE	<ul style="list-style-type: none"> • Presença de dor e/ou parestesia, sensação local ou regional de “choque elétrico” • Calor, edema, eritema, sudorese e piloereção podem ocorrer no local da picada.
MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> • Pode apresentar quaisquer manifestações descritas para casos leves, além de uma ou mais das seguintes manifestações: • Sensação de choque elétrico em metade do corpo o em todo o corpo. • Movimentos musculares anormais (tônus muscular alterado, mioclonia, hipertonia ou hipotonia, fasciculação, espasmo) sem rabdomiólise • Alterações nos olhos (I), fala (II), funções cinéticas (III) e postura ou marcha (IV) com base nos escores da Escala de Avaliação da Ataxia Cooperativa (ICARS), independente da intensidade*. • Pode ocorrer vômito.
GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> • Quaisquer manifestações descritas para os casos leves e moderados, além de uma ou mais das seguintes: • Manifestações compatíveis com rabdomiólise, como hipertonia intensa, espasmos frequentes e aumento dos níveis séricos de enzimas musculares, como creatinoquinase, aldolase, desidrogenase láctica e mioglobinúria. • Qualquer evidência de lesão renal aguda; colúria, oligúria, aumento dos níveis séricos de ureia e creatinina. • Manifestações gastrointestinais intensas, como vômitos incoercíveis. • Alteração acentuada da pressão arterial, arritmia cardíaca, agitação intensa, convulsão.

Acesse um instrutivo de Avaliação Neurológica através do QR-CODE abaixo:



Acesse a escala de ICARS através do QR-CODE abaixo:



BORGES et al. Scorpionism in Pará, Brazil: Clinical assessment of neuromuscular manifestations. Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine. Vol 58. doi <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0053-2025>.

Apoio:

