

O que são Vacinas?

As vacinas são compostos biológicos que estimulam o corpo a se defender contra os organismos que provocam doenças. Pois são produzidas a partir de microrganismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados, que em contato com o corpo, estimula a criação de anticorpos e evitam que a doença ocorra no futuro, conferindo imunidade.

As vacinas têm efeitos colaterais?

As vacinas são muito seguras. A maioria das reações são geralmente baixas e temporárias, como: vermelhidão, inchaço, dor, irritabilidade no local de aplicação e ligeira febre. Eventos graves de saúde são extremamente raros e cuidadosamente monitorados e investigados. É muito mais fácil uma pessoa adoecer por uma doença evitável do que pela própria vacina.



Orientações para as vacinas

1. Quando ocorrer febre, utilizar antitérmico com prescrição médica;
2. Não usar paracetamol antes ou após a vacinação para não interferir na criação de imunidade;
3. Compressa de água gelada ou gelo com cuidado para não machucar a pele caso dor no local de aplicação dolorido.

Falsas Contraindicações

1. Ocorrência de efeito colateral em dose anterior de uma vacina, a exemplo da reação local (dor, vermelhidão ou inflamação no lugar da injeção);
2. Congestão nasal, tosse, espirros e sem febre. Uso de corticosteroides inalatórios, ou de uso tópico;
4. Alergias, exceto as alergias graves a algum componente da vacina;
5. Uso de antibiótico terapêutico e antiviral.



Referências:

Imagens retiradas do Google imagens

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. 2014

OMS. Cartilha de vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas. 2003



Quando vacinar a criança?

Ao nascer:

-BCG

-Hepatite B

Aos 2 meses:

-Pentavalente

-Rotavírus

-Poliomielite (VIP)

-Pneumocócica 10

Aos 3 meses:

-Meningocócica C

Aos 4 meses:

-Pentavalente

-Rotavírus

-Poliomielite (VIP)

-Pneumocócica 10

Aos 5 meses: -Meningocócica C

Aos 6 meses: -Pentavalente

-Rotavírus

-Poliomielite (VIP)

-Pneumocócica 10

Aos 9 meses: -Febre amarela

Aos 12 meses: -Tríplice Viral

-Pneumocócica 10

-Meningocócica C

Aos 15 meses: -DTP

-Tetra Viral

-Hepatite A

- Poliomielite (VOP)

Aos 4 anos: -Varicela


-DTP

-Poliomielite (VOP)

Aos 9 aos 14 anos (meninas)/ -HPV Aos 11 aos 14anos (meninos)

Observação: Quando ocorre surto de sarampo a criança recebe uma dose extra da tríplice viral chamada dose zero como medida preventiva, preferencialmente para crianças entre 6-12 meses

A Vacina e a Criança



Docentes: Lilliane Faria da Silva e Luciana
Rodrigues da Silva

Alunas: Natália Máris da Silva Santos, Priscilla
Monteiro dos Santos, Ana Vitória Carvalho
Leonardo, Lerrany Viana de Souza, Stéfany
Marinho de Oliveira, Michelle Alves Barreto
Gonçalves, Thais Pereira Dias, Daniela Dias
Correia, Lorena Teixeira dos Santos, Ana
Letícia Rodrigues Silva

