



Coronavac/ Butantan	Aztrazeneca/ Oxford
Contém o vírus <i>SARS-CoV-2</i> inativado	Vetor viral não replicante
Eficácia de 97% após as duas doses*	Eficácia de 82,4% com a segunda dose*
Intervalo de 28 dias entre as doses	Intervalo de 90 dias entre as duas doses

* Eficácia referente aos grupos que foram contemplados nas pesquisas




A SEGUNDA DOSE DEVE SER SEMPRE DO MESMO FABRICANTE DA PRIMEIRA DOSE, RESPEITANDO-SE O INTERVALO ENTRE AS DOSES.




As vacinas possuem o intuito de estimular o sistema imune a criar anticorpos, as vacinas não provocam a respectiva doença

Contraindicações: pacientes imunossuprimidos e/ou em tratamento oncológico, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, menores de 18 anos.




Reações Adversas mais comuns: dor local (braço), fadiga, febre leve, dor de cabeça, diarreia e náuseas





IDENTIFICAÇÃO



- Ter em mãos documento de identificação oficial com foto (RG, carteira profissional, CNH, CTPS) e o número do CPF ou CNS.



RESPEITAR O GRUPO QUE ESTÁ SENDO VACINADO NO DIA



Manter o distanciamento na fila, seguindo as marcas indicadas no chão. Respeite a fila, todos terão sua vez.

Manter sempre a máscara sobre a boca e o nariz.

Higienizar as mãos antes e depois de cada etapa.




COMPROVANTE DE VACINAÇÃO




Deve conter: CARIMBO DA UNIDADE, FABRICANTE DA VACINA, LOTE, DATA DA PRIMEIRA DOSE, DATA DE RETORNO PARA A SEGUNDA DOSE (escrita à lápis), NOME DO VACINADOR



VACINAÇÃO



- Apresentar o comprovante ao vacinador.
- Acompanhante deve se manter atrás da faixa indicada no chão, filmagens e fotografias são permitidas desde que os profissionais não apareçam nas filmagens ou fotos.



- Observar a dose da vacina sendo aspirada, devendo conter 0,5 ml.
- É indicado a administração da vacina no braço direito (intramuscular), com algumas exceções.
- Observar a seringa vazia após a dose ser administrada.

