

#Você sabia?

VACINAS em FOCO

Público alvo:       **ADULTO**

Proposta

Apresentar algumas vacinas de extrema importância para adultos. A estruturação da pesquisa aconteceu através do levantamento e coleta na plataforma: <https://bvsmms.saude.gov.br>.

Orientações Iniciais

Em caso de estado febril ou estar fazendo uso de antibiótico, não é recomendado tomar nenhuma vacina. Recomenda-se tomar a vacina 15 dias após o término do medicamento.

#VACINAS SÃO SEGURAS!

A vacinação é a medida mais eficaz na prevenção de doenças. Todas as vacinas passam por uma série de estudos, testes e avaliações rigorosas antes de serem liberadas para a população, isso garante sua **total segurança e eficácia**.

Algumas vacinas podem provocar **efeitos temporários**, como: febre local; náuseas; dores e mal-estar.

#Xô, individualismo!







Ao se vacinar, você não protege somente a si, mas a vida do próximo!

CONTRA COVID - 19 (COVID-19) VIA INTRAMUSCULAR

	FRASCO MULTIDOSES OU DOSE ÚNICA		SERINGA DE 1ML OU 3ML
	AGULHAS : 25X6 OU 25X 7		FORMA FARMACÊUTICA: SEM DILUIÇÃO
	ASPIRAR : 0,3 OU 0,5 ML		APICAÇÃO EM QUALQUER BRAÇO







Nº de doses dependendo do fabricante.

ANTIIRRÁBICA (RAIVA) VIA INTRAMUSCULAR

	FRASCO DOSE ÚNICA		SERINGA DE 1ML OU 3ML
	AGULHAS : 25X6 OU 25X 7		FORMA FARMACÊUTICA: PÓ + DILUENTE OU SEM DILUIÇÃO
	ASPIRAR 0,5 ML		APICAÇÃO NO MÚSCULO DELTOÍDE - BRAÇO DIREITO







Esquema de dose diretamente proporcional à extensão, mordedura e profundidade da lesão.

INFLUENZA (H1N1, H3N2 E B) VIA INTRAMUSCULAR

	FRASCO MULTIDOSES: 10 DOSES		SERINGA DE 1ML OU 3ML
	AGULHAS : 25X6 OU 25X 7		FORMA FARMACÊUTICA: SEM DILUIÇÃO
	ASPIRAR 0,5 ML		APICAÇÃO NO MÚSCULO DELTOÍDE - BRAÇO DIREITO







Pacientes crônicos que fazem uso de anticoagulante (AAS, etc.) têm risco de sangramento. Nesse caso, usa-se a agulha subcutânea 13x 4,5 para evitar sangramentos. A DOSE É ANUAL!

TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA) VIA SUBCUTÂNEA

	FRASCO MULTIDOSES: 5 DOSES		SERINGA DE 1ML OU 3ML
	AGULHAS : 13 X 4,5		FORMA FARMACÊUTICA: SEM DILUIÇÃO
	ASPIRAR 0,5 ML		APICAÇÃO NO BRAÇO DIREITO





ANTIAMARÍLICA (FEBRE AMARELA) VIA SUBCUTÂNEA

	FRASCO MULTIDOSES: 5 DOSES		SERINGA DE 1ML OU 3ML
	AGULHA : 13 X 4,5		FORMA FARMACÊUTICA: PÓ + DILUENTE
	ASPIRAR 0,5 ML		APICAÇÃO NO BRAÇO DIREITO






A diluição acontece com a agulha intramuscular 25x7. Tempo de durabilidade após aberta 4 horas

DUPLA ADULTO (DIFTERIA E TÉTANO) VIA INTRAMUSCULAR

	FRASCO MULTIDOSES: 10 DOSES		SERINGA DE 1ML OU 3ML
	AGULHAS : 25X6 OU 25X 7		FORMA FARMACÊUTICA: SEM DILUIÇÃO
	ASPIRAR 0,5 ML		APICAÇÃO NO BRAÇO ESQUERDO

Renovar vacina a cada 10 anos estando o esquema vacinal completo!

ANTI-HEPATITE B (HEPATITE B) VIA INTRAMUSCULAR

	FRASCO MULTIDOSES: 10 DOSES OU 20 DOSES		SERINGA 3ML
	AGULHAS : 25X6 OU 25X 7		FORMA FARMACÊUTICA: SEM DILUIÇÃO
	ASPIRAR : <20 ANOS = 0,5 ML >20 ANOS = 1 ML		APICAÇÃO NO MÚSCULO DELTOÍDE - BRAÇO DIREITO

Portadores de doenças renais crônicas/ insuficiência renal (fazendo hemodiálise) devem apresentar prescrição médica para dosagem dobrada. Assim, o esquema vacinal será: < 20 anos = 1ml e > 20 anos = 2 ml. A prescrição médica fica retida.