










Pedro

Para a
Cavidade amniótica
Terminado na
Ápice
Com seu
Papila
Situada nos
Localizado majoritáriamento no
E consequente
Que desembocam nos
Maiores
Menores
Pirâmides renais
Colunas renais
Cortical
Justaglomerular
Dividida em
Gordura perirenal
Que pode ser
Que realizam a
Filtração sanguínea
Onde normalmente não passam substancias
Córtex
Medula
Néfron
Que por sua vez é formado por
Com
Hilo
Musculatura lisa
Têm
Para impulsionar a
Cristais de oxalato
Cálices
Fazem parta da
É composta de
Ureteres
Pelve renal
Ureter
Alto peso molecular
Macroscópica
Microscópica
Os quais, nessa condição, sofrem uma
Lesão
No
É constituída de
Túbulo coletor
Estes abrem-se para os
Ductos papilíferos
Túbulos mesonefricos
Tornam-se os
Túbulo contorcido distal
Formado por
Epitélio simples cúbico
Epitélio cúbico simples
Com papel na formação da
Ducto coletor
Que desemboca no
Com a presença de
Constituídos de
Com a
4ª semana
Que aparecem no início da
Mácula densa
Que aparecem no final da
Constituída de
Células cilíndricas altas
Ductos deferentes
Nos
Testículos
Que diminui o
Angiotensina II
Que diminui o
Cápsula de Bowman
Integrado por
Folheto
Interno
Entre os quais está o
Espaço capsular
Formado por
Externo
Aferente
Eferente
Polo vascular
Corpúsculo renal
Com
Glomérulo
Que possui uma
Arteríola
Localizada no
Podócitos
Que vão regular o
Fluxo sanguíneo
Que recebe o
Lâmina basal
Epitélio cúbico simples
Epitélio simples pavimentoso
Formado por
Túbulo contorcido proximal
No
Polo urinário
Alça de Henle
Dividida em
Parte descendente
Parte ascendente
Que
Com
Epitélio pavimentoso simples
NaCl
Cl-
H2O
Reabsorve
Filtrado gromerular
Físico
Emocional
Dos
Filhos
Causando
Esgotamento
Distanciamento
Excretada
Bexiga urinária
Para a
Cujas características são
Sentimento
De
Incompetência
É
Período fetal
Que no
Que produzem
Que faz parte do
Rins
Como
Anatomia
Estrutura transitória
Que são uma
Pronefros
Seguido dos
Mesonefros
Assim originando os
Metanéfros
Nos
Os quais tem
E lesam o
Que é a urina com
Imunocomplexos
Vão atuar sobre os
Causando
Depósitos de
Para
Fibrina
Receptores
Tem
Mesângio
Hormônio natiurético
Fagocitose
Realizam
Proliferacao de células
Do
Endotélio capilar renal
Rins aumentados
Levando a
Que constataram
Sinal de giordado
Positivo
Bilateral
Ureia= 98mg/dl
PA=140X80 mmHg
Exames
Realizou
Pedro
Tem
Apresenta
Oligúria
Que levou a
Causando a
Edema
Que é a expansão do volume do
Líquido intersticial
Dos
Membros inferiores
Que progrediu para uma
Anasarca
Que é a
Forma generalizada
Do
Periorbitário
Facial
Urina escurecida
Em razão da
Metabolismo muscular
Oriunda do
Que confiraram
Creatinina=3,4mg/dl
6 anos
Evidenciado pela
Taxa de filtração gromerular
GNDA
Precedida pela
Caracterizada por
Síndrome nefrítica aguda
Que acomete os
Proteínas
Nos
Hemácias
Que é a urina com
Hematúria
Que leva a
Proteinúria
Alterações
Devido a uma
Infecção
Com
Causando
Devido a
Inflamação renal
Pela deposição de
Alterando a
Permeabilidade
Logo
Causando
Clearance de creatinina: 22ml/m2
Streptococcus
Campo coberto de hemácias
20 leucócitos por campo
Hemácias dismórficas
Causado por
Cilindros hemáticos
EAS
Sangueneos
Fisicos
Biópsia
Imagem
De
Que levou a
Causando a
Mãe
Que foi informada que o filho estava com
Que mostra sinais de
Pela orientação da
Chá de carambola
Que possui a toxina
Tomado
Que é
Neurotóxica
Carambóxina
Que inibe o
Sistema GABAérgico
Na
Dor
Ácido oxálico
Burn out materno
Região lombar bilateral
Devido a localização dos
Tecido conjuntivo denso
Envolvido por uma cápsula de
Que foi informada que o filho estava com
Que é a urina com
Que são uma
Que aparecem no início da
Que aparecem no final da
Assim originando os
Que leva a
Devido a uma
Que constataram
Levando a
Proliferacao de células
Do
Endotélio capilar renal
Que é a expansão do volume do
Líquido intersticial
Que levou a
Causando a
Que inibe o
Que possui a toxina
Que é
Em razão da
Metabolismo muscular
Oriunda do
Que confiraram
Creatinina=3,4mg/dl
Evidenciado pela
Taxa de filtração gromerular
Precedida pela
Caracterizada por
Síndrome nefrítica aguda
Que acomete os
Proteínas
Nos
Hemácias
Que é a urina com
Hematúria
Que leva a
Proteinúria
Alterações
Devido a uma
Infecção
Com
Causando
Devido a
Inflamação renal
Pela deposição de
Alterando a
Permeabilidade
Logo
Causando
Clearance de creatinina: 22ml/m2
Streptococcus
Campo coberto de hemácias
20 leucócitos por campo
Hemácias dismórficas
Causado por
Cilindros hemáticos
EAS
Sangueneos
Fisicos
Biópsia
Imagem
De
Que levou a
Causando a
Que constataram
Sinal de giordado
Positivo
Bilateral
Ureia= 98mg/dl
PA=140X80 mmHg
Exames
Realizou
Pedro
Tem
Apresenta
Oligúria
Que levou a
Causando a
Edema
Que é a expansão do volume do
Líquido intersticial
Dos
Membros inferiores
Que progrediu para uma
Anasarca
Que é a
Forma generalizada
Do
Periorbitário
Facial
Urina escurecida
Em razão da
Metabolismo muscular
Oriunda do
Que confiraram
Creatinina=3,4mg/dl
6 anos
Evidenciado pela
Taxa de filtração gromerular
GNDA