

IMPORTANTE!

O preservativo é o método mais conhecido, acessível e eficaz para se prevenir da infecção pelo HIV e/ou HTLV.



Amamentação X HIV ou HTLV

É **contraindicado** que mulheres que vivam com HIV ou com HTLV amamentem, pois esses vírus podem ser transmitidos ao bebê pelo leite materno.

É recomendado que a nutrição da criança seja feita com fórmulas indicadas por um médico.

Vale lembrar ...

Os testes e o tratamento são oferecidos gratuitamente pelo SUS - tanto para o bebê quanto para a mulher e os seus parceiros.

Referência:


Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO (EEAP)
ESTÁGIO CURRICULAR NA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER (ECASM)

DOCENTES: Prof^a. Dr^a. Inês Maria Meneses dos Santos
Prof^a. Dr^a. Cristiane Rodrigues da Rocha
Prof^a. Dr^a. Eliza Cristina Macedo

HIV e HTLV



Criado pela:

Acad. de Enf.: Aylee de Souza Cordeiro
sob a supervisão da Enf.^a do Ambulatório de Pré-natal do Hospital Universitário Gaffrée Guinle (HUGG): Márcia Neves Barbosa

HIV

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) compromete o sistema imune, destruindo os linfócitos TCD4.

HTLV

O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) infecta as células de defesa do organismo, os linfócitos T.

Recomendações para todas as gestantes e suas parcerias sexuais no pré-natal:

Testagem de HIV e HTLV **duas vezes** durante a gestação - uma no primeiro trimestre e a outra no último trimestre.



Em caso de diagnóstico positivo para HIV e/ou HTLV

Iniciar tratamento imediatamente.

IMPORTANTE!

Adesão ao esquema terapêutico

O uso regular e correto dos medicamentos antirretrovirais prescritos previnem a transmissão do HIV da mãe para a criança. Como não há tratamento bem estabelecido para o HTLV, é indicado o acompanhamento periódico, por meio de exames para que seja verificada a capacidade reprodutiva do vírus e as probabilidades de transmissão viral.

Além disso, é importante seguir as recomendações médicas, comparecer as consultas, manter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos.



ATENÇÃO

A criança precisará ser medicada e acompanhada, com possibilidades de não contrair HIV e/ou HTLV se a mãe aderir ao esquema terapêutico de forma adequada.

