


Ipê Amarelo
(*Tabebuia ochracea*)



Fruto tipo vagem aveludada com abertura natural.



Sementes aladas e leves dispersadas pelo vento.

Época de coleta de outubro a novembro.

Semeio simples.

Origem: Cerrado.
Altura: De 4 a 14 metros.
Floração: De julho a setembro.
Raízes: 15 metros de profundidade.
Folhas: Opostas e compostas.
Propagação: Por meio de sementes.

Ocorrência maior em todo território de Cerrado.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



CARTA CORINGA!
ATENÇÃO, só poderá descartar na próxima rodada.

CUTIA
(*Dasyprocta azarae*)



Seu hábito de enterrar sementes contribui com a dispersão de árvores, como as araucárias.

Jacarandá Caviúna
(*Machaerium scleroxylon Tul.*)



Frutos secos, alados e indeiscentes.



Sementes leves, achatadas e uma por fruto.

Época de coleta de agosto a setembro.

Germinação de 30 a 40 dias.

Origem: Cerrado.
Altura: Até 30 metros.
Floração: De outubro a dezembro.
Raízes: Pivotantes.
Folhas: Compostas pinadas.
Propagação: Sementes e mudas.


Pode ser encontrada em todo território de Cerrado.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



Pau Brasil
(*Paubrasilia echinata*)



Fruto tipo vagem, com cor marrom quando maduros.



Semente achatada, elíptica, lisa e castanha.

Época de coleta de janeiro a abril.

Germinam 5 dias após o plantio.

Origem: Mata Atlântica.
Altura: Até 15 metros.
Floração: De setembro a dezembro.
Raízes: Tipo tabulares.
Folhas: Compostas alternadas.
Propagação: Estacas e sementes.

Sua maior ocorrência vai do litoral do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



CARTA CORINGA!
ATENÇÃO, só poderá descartar na próxima rodada.

CUTIA
(*Dasyprocta azarae*)



Seu hábito de enterrar sementes contribui com a dispersão de árvores, como as araucárias.

Seringueira
(*Hevea brasiliensis*)



Fruto tipo tricocas (três dilatações).



Dispersão balística da semente (Fruto que explode).

Época de coleta de fevereiro a março.

Germinam 10 dias após o plantio.

Origem: Amazônia.
Altura: Até 30 metros.
Floração: De agosto a outubro.
Raízes: Pivotantes.
Folhas: Compostas trifoliadas.
Propagação: Estacas e sementes.

Ocorre, principalmente, na região Amazônica.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



Angelim-do-cerrado
(*Vatairea macrocarpa*)



Fruto alado de tamanho médio.



Sementes arredondadas e achatadas, uma por fruto.

Época de coleta de dezembro a janeiro.

De 20 a 30 dias para germinar.

Origem: Cerrado.
Altura: De cinco a 10 metros.
Floração: De agosto a setembro.
Raízes: Profundas e ramificadas.
Folhas: Compostas, imparipinadas.
Propagação: Estacas e sementes.

Encontrada no Maranhão, Mato Grosso, caatinga do nordeste, e Mato Grosso do Sul.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



SEMENTE EM COPO D'ÁGUA



Jequitibá
(*Cariniana estrellensis*)



Fruto seco e descente, em formato de cachimbo.



Sementes aladas de até 4 cm, dispersadas pelo vento.

Época de coleta de julho a setembro.


Germinação de 06 a 70 dias.

Origem: Cerrado.
Altura: Pode atingir 50 metros.
Floração: De setembro a outubro.
Raízes: Dicotómica e simpática.
Folhas: Tipo simples e lanceoladas.
Propagação: Por sementes.

Presente, principalmente, em áreas de Cerrado e de Mata Atlântica.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



Angico
(*Anadenanthera falcata*)



Frutos descentes, achatados, orbiculares e marrons.



Sementes aladas e leves, dispersadas pelo vento.

Época de coleta de março a abril.

Germinação de 5 a 8 dias.

Origem: Cerrado.
Altura: De 08 a 25 metros.
Floração: De setembro a dezembro.
Raízes: Profunda e vigorosa.
Folhas: Compostas, bipinnadas.
Propagação: Estacas e sementes.


Ocorre em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:



Araucária
(*Araucaria angustifolia*)



Pseudofrutos agrupados em pinhas, que ficam circulares quando maduros.



Sementes, ou pinhões, de cor marrom, cônicas e aladas.

Época de coleta de abril a julho.

Germinação de 20 a 40 dias.

Origem: Pampas.
Altura: Até 50 metros.
Floração: De agosto a janeiro.
Raízes: Pivotante, aprox. 1,8 m.
Folhas: Aciculas espiraladas.
Propagação: Sementes e mudas.

Árvore encontrada desde Minas Gerais e Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul.



SAIBA MAIS NO LINK DISPONÍVEL NO QR CODE, ABAIXO:

