






@cuidados.alzheimer

Riscos de lesão por pressão em idosos acamados







As lesões por pressão são provenientes de uma isquemia tecidual prolongada, no qual ocorre em pessoas que por algum motivo fiquem na mesma posição por um período prolongado.



Esse fator é ainda mais preocupante quando se trata de idosos, visto que o tecido epitelial é muito mais sensível se comparado a outras idades.




Nos hospitais, as lesões por pressão são indicadores de qualidade do serviço, pois mostra se a assistência é eficaz.



Para que o paciente tenha um risco diminuído ou seja aplicado **medidas preventivas**, a equipe deve fazer uma boa anamnese e aplicar as escalas (Escala de Braden) de forma adequada.

Dessa forma, a equipe multiprofissional visa os cuidados desse idoso para que a alimentação, os remédios e a sua posição sejam favoráveis para o não aparecimento dessas lesões







Além disso, existem pacientes que preferem ser tratados em casa através do Serviço de Atenção Domiciliar.



Muitas vezes o paciente recebe mais atenção em casa do que na UTI ou enfermaria que é dividida com mais pessoas, porém isso não significa que deva ter menos preocupação.


Os locais mais comuns para o surgimento das lesões por pressão são: região sacra, trocantérica e calcânea.





Portanto, as lesões por pressão são mais comuns em acamados e idosos devido a sua situação de vulnerabilidade.

Então, tanto no atendimento hospitalar, quanto no atendimento domiciliar, deve-se ter o cuidado em relação a isso, fazendo a mudança de decúbito de acordo com a demanda do paciente.



Isto porque, é mais fácil prevenir uma lesão por pressão do que tratar uma.





Quer saber mais sobre o assunto?

Acesse o nosso **blog** e o nosso **site!**

Os link se encontram na bio do nosso instagram e na descrição da publicação.

Lá você vai encontrar o material completo e **muitas outras informações!**



<https://cicacamacho.blogspot.com/>



<http://cuidadosalzheimer.uff.br/>



Gostou da publicação?




Salve



Curta



Comente



Compartilhe



Autores:



Alessandra Conceição L. F. Camacho
Enfermeira. Prof.^a Associada da Escola
de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa



Juliana de Oliveira Nunes da Silva
Acadêmica de Enfermagem do 9º
Período



Paola Paiva Monteiro
Acadêmica de Enfermagem do 7º
Período



Suellen de Almeida Barroso
Acadêmica de Enfermagem do 9º
Período



Victor Hugo Gomes Ferraz
Acadêmico de Enfermagem do 10º
Período



Referencias Bibliográficas:

Vanderley ICS, Santana ADS, Nascimento BABF, Morais LC, Souza CVC, Santos GC, et al. Risco de Lesões Por Pressão em idosos no domicílio. Rev enferm UFPE on line. 2021;15(2):e244597 DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.244597>

BARROS, P. M.; SILVA, S. E. V.; OLIVEIRA, T. M. Ações de enfermagem na prevenção e tratamento de pacientes com úlcera por pressão. 2013. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Curso de graduação em Enfermagem, Faculdade Integrada de Pernambuco, Recife, PE. Disponível em: Acesso em 11 de setembro de 2018.

COSTA, I. G. Incidência de úlcera por pressão em hospitais regionais de Mato Grosso, Brasil. Rev. Gaúcha Enferm. [Internet] 2010 [citado 2016 mai 15];31(4):693-00. Disponível em: . Acesso em: 20 ago. 2018.

LIMA, M. I. V. DE O. et al. Lesão por pressão em pacientes acamados com idade avançada e os cuidados de enfermagem: Uma revisão integrativa da literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 5, p. e16310513373, 30 abr. 2021.