

Aplicação de anticoagulante (Clexane):

- Lave bem as mãos.
- Antes de administrar CLEXANE confira a embalagem com a prescrição do médico.
- A seringa já está pronta para uso. Observe que existe uma pequena bolha de ar dentro da seringa. Este ar é inerte e não retira-lo!
- O CLEXANE deverá ser administrado, de preferência, com o paciente deitado
- O local ideal para a injeção subcutânea é no tecido celular subcutâneo do abdômen (cintura), alternando-se, a cada aplicação, o lado direito com o esquerdo.
- Deve-se proceder a limpeza do local da aplicação com álcool 70%
- A injeção subcutânea, consiste na introdução da agulha verticalmente em todo o seu comprimento, na espessura de uma prega cutânea feita entre os dedos polegar e indicador.
- Injetar lentamente o conteúdo da seringa até ouvir o 'click' e ter o retorno da proteção da agulha.
- Mantenha esta prega cutânea até o final da injeção.
- Ao final, faça discreta compressão local sem massagear.
- Para que a aplicação do Clexane atinja a atividade terapêutica esperada, é necessário que seja aplicada em locais apropriados.
- Descarte a seringa dentro de uma garrafa com tampa e leve ao Posto após o período das aplicações

ATENÇÃO: Em caso de sangramentos, acionar o médico assistente.

