



@cuidados.alzheimer

Perda auditiva em idosos



A perda auditiva é uma das alterações mais comuns associadas ao processo de envelhecimento, porém ela ainda é subnotificada.



Essa condição pode afetar a **qualidade de vida** das pessoas idosas e seus cuidadores, uma vez que a audição desempenha um papel fundamental na comunicação e na interação social



Esse problema nos idosos também pode estar relacionado a condições médicas específicas, como a **doença de Alzheimer** e outras demências.

Portanto, é importante que os profissionais de saúde estejam atentos não apenas à perda auditiva, mas também aos cuidados



A perda auditiva natural é lenta e pode levar longo dos anos para ocorrer, contudo, ela geralmente afeta ambos os

ouvidos, e pode resultar em dificuldades de entender a fala, especialmente em ambientes com diversos sons diferentes



Além da perda auditiva, outras alterações também podem ocorrer com o envelhecimento, como a diminuição na



capacidade de discriminar sons e a perda da capacidade de localizar a fonte de um som



Com isso, esteja sempre atento às alterações que podem ocorrer no cotidiano e procure ajuda sempre que necessário.



Quer saber mais sobre o assunto?

Acesse o nosso **blog** e o nosso **site**!

Os link se encontram na bio do nosso instagram e na descrição da publicação.

Lá você vai encontrar o material completo e muitas outras informações!



<https://cicacamacho.blogspot.com/>



<http://cuidadosalzheimer.uff.br/>

Gostou da publicação?




Salve



Curta



Comente



Compartilhe

Autores:



Alessandra Conceição L. F. Camacho
Enfermeira. Prof.^a Associada da Escola
de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa



Juliana de Oliveira Nunes da Silva
Acadêmica de Enfermagem do 10º
Período



Paola Paiva Monteiro
Acadêmica de Enfermagem do 8º
Período



Suellen de Almeida Barroso
Acadêmica de Enfermagem do 10º
Período



Victor Hugo Gomes Ferraz
Acadêmico de Enfermagem do 10º
Período

Referencias Bibliográficas:

COSTI, B. B. et al.. Perda auditiva em idosos: relação entre autorrelato, diagnóstico audiológico e verificação da ocorrência de utilização de aparelhos de amplificação sonora individual. **Revista Kairós-Gerontologia**, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 179–192, 2014. DOI: 10.23925/2176-901X.2014v17i2p179-192.

Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/21706>. Acesso em: 12 set. 2023.

GUARISCO, LPC et al. Percepção da perda auditiva: utilização da escala subjetiva de faces para triagem auditiva em idosos. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. 2017, v. 22, n. 11, p. 3579-3588. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.277872016>>. <https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.277872016>. Acesso em 12 set 2023.