



UM ESPAÇO SEGURO

Receber um diagnóstico de HIV pode ser avassalador, mas nesta batalha contra uma doença tão desafiadora, você não está sozinho.

Os grupos de apoio oferecem uma fonte inestimável de força emocional, informações essenciais e senso de comunidade

LETRA DA MÚSICA



HIV positivou?
Não se apavore não
Existe um grupo de apoio
Pra acalmar seu coração
Entender seus sentimentos
E poder te orientar
Ah! Como é bom te ajudar!

Depois que a PEP eu conheci fui mais
feliz
Usada após exposição que eu sempre
quis
Ela é útil pra logo prevenir
Com ela o risco de HIV teve fim

Se for ter relações
A camisinha precisa usar
Pois só quem sabe
Consegue se cuidar

Refrão


O suporte eu vou ter
Educação em saúde, eu já saquei
Vem! Me ajude a entender
Cada cuidado que terei

HIV positivou?
Não se apavore não
Existe um grupo de apoio
Pra acalmar seu coração
Entender seus sentimentos
E poder te orientar
Ah! Como é bom te ajudar!

PARÓDIA DA MÚSICA "METEORO DA PAIXÃO" DO LUAN SANTANA DE
COMPOSIÇÃO AUTURAL PELOS INTEGRANTES DO GRUPO PARA A
DISCIPLINA DE SAÚDE DA MULHER DO GRUPO




UNIDAS CONTRA O HIV



INTEGRANTES DO GRUPO: ANNA JULIA CAVADINHA,
EDUARDA CARDOSO, GABRIEL CORREIA, GABRIELLI
TELES, LARISSA ABDALA E MARIA EDUARDA ALVES

HIV / AIDS

AIDS é uma sigla que é utilizada para designar a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida que é transmitida pelo vírus HIV.



PEP- PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO

- Indicada em situações de emergências para quem não tem HIV, porém foi exposto
- Tomada por 28 dias para prevenir a infecção pelo HIV, se for iniciada em até 72h após a exposição



A CAMISINHA FEMININA TAMBÉM PROTEGE VOCÊ

Afinal, uma das formas mais conhecidas de transmissão do HIV se dá através de sexo desprotegido. A transmissão do HIV também pode se dar através de transfusão de sangue contaminado, Instrumentos perfurocortantes contaminados e de uso compartilhado. Além de poder ser transmitido de forma vertical, de mãe para filho.

PREP: PROFILAXIA PRÉ EXPOSIÇÃO

- Uso indicado para antes da exposição ao HIV
- Para mulheres cujos parceiros são HIV+, requer consulta médica a cada 3 meses e exames de acompanhamento
- Quando tomada corretamente, pode reduzir o risco de contrair HIV durante o sexo em mais de 92%

