


GUIA PRÁTICO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS

MORFOLOGIA DA LESÃO		VERDE	PRETO	AMARELO	VERMELHO				REPARAÇÃO	ROSA			PELE ÍNTEGRA
		INFECÇÃO	NECROSE	ESFACELO	GRANULAÇÃO COM ESFACELO	GRANULAÇÃO COM EXSUDATO	GRANULAÇÃO SEM EXSUDATO	QUEIMADURAS	FERIDA CIRÚRGICA	FASE DE RE-EPITELIZAÇÃO	HIPEREMIA	DERMATITE	ÁREAS DE PRESSÃO
IMAGEM													
OBJETIVO		Reduzir carga bacteriana	DEBRIDAMENTO -Remover tecido inviável e hidratar; - Realizar escarotomia.	DESRIDAMENTO -Remover tecido inviável e controlar exsudato; - Preencher túneis e cavidades; - Proteger Bordas.		Manutenção do meio úmido e controle do exsudato	Manutenção do meio úmido	- Prevenis infecção; - Manter meio úmido; - Avaliar necessidade de desbridamento.	Promover isolamento e proteger.	Hidratar e Proteger		Controlar a causa, tratar e proteger	Prevenção
1ª Opção de Tratamento	Cobertura Primária	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	ASSEPSIA: POLIHEXANIDA	FILME TRANSPARENTE	ÓLEO DE GIRASSOL FITOSCAR TEGUM	CREME BARREIRA S/UREIA, FITOSCAR TEGUM	SILICONE, FILME TRANSPARENTE PROXIMEL CUTIMED
		AQUACEL; EXTRA AG, ATRAUMAN, CARVÃO ATIVADO; MESALT HYDROCLEAN EXUFIBER AG+	HIDROGEL; GAZE DE RAYON; HIDROCOLOIDE; ALGINATO DE CÁLCIO S/ PRATA;	AQUACEL AG+ EXUFIBER AG+ ALGINATO DE CÁLCIO C/ PRATA; MESALT;	ALGINATO DE CÁLCIO COM OU SEM PRATA; MESALT EXUFIBER AG+	ALGINATO DE CALCIO; MESALT EXUFIBER AG+	HIDROGEL COM ALGINATO, FITOSCAR MESALT EXUFIBER AG+	AQUACEL EXTRA COM OU SEM AG, BIATAIN IBU TEGUM					
	Curativo Secundario	BIATAIN AG FOAM AG	ESPUMA DE POLIURETANO	BIATAIN AG; FOAM AG	ESPUMA DE POLIURETANO	ESPUMA DE POLIURETANO: FOAM; BIATAIN;	ESPUMA DE POLIURETANO	MALHAR TUBULAR PARA FIXAÇÃO		NÃO USAR	NÃO USAR	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	Troca	INDICAÇÃO: 4 DIAS - OBS. SATURAÇÃO E TROCA DO CURATIVO 2º	INDICAÇÃO: A CADA 24HS	INDICAÇÃO: 4 DIAS - OBS. SATURAÇÃO E TROCA DO CURATIVO 2º	INDICAÇÃO: 3 DIAS - OBS. SATURAÇÃO E TROCA DO CURATIVO 2º	INDICAÇÃO: 4 DIAS - OBS. SATURAÇÃO E TROCA DO CURATIVO 2º	DIARIAMENTE	INDICAÇÃO: 14 DIAS DE AQUACEL E BIATAIN IBU A CADA 72H	DIARIAMENTE	INDICAÇÃO: 7 DIAS - OBS. INTEGRIDADE	INDICAÇÃO: DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	INDICAÇÃO: 7 DIAS - OBS. INTEGRIDADE