


EXAME PREVENTIVO



P: QUANDO DEVO FAZER O EXAME DE CITOLOGIA (PAPANICOLAU)?

Toda mulher que tem ou já teve vida sexual;


Entre 25 e 64 anos;

Anualmente - Após 2 exames seguidos NORMAIS, deve ser realizado a cada 3 anos.

P: QUAIS AS ORIENTAÇÕES ANTES DE REALIZAR O EXAME?

Preferencialmente, não deve estar menstruada, nem ter feito relações ou usado lubrificantes vaginais nas últimas 24h.

COMO SE PROTEGER?



P: QUEM PODE TOMAR A VACINA CONTRA O HPV?

DOSE ÚNICA: Vacinação pelo SUS para meninas e meninos entre 9-14 anos;

DUAS DOSES - 0 e 6 meses

- Vítimas de violência sexual entre 9-14 anos

TRÊS DOSES- 0, 2 e 6 meses:

- Homens e mulheres de 9-45 anos em condições clínicas especiais, (HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos (imunossuprimidos)
- Pessoas entre 15-45 anos que fazem PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV)
- Vítimas de violência sexual entre 15-45 anos

A VACINA TAMBÉM PROTEGE CONTRA OS CÂNCERES DE VULVA, VAGINA, PENIANO, ANAL, OROFARINGE, ALÉM DE VERRUGAS GENITAIS.




UBS SANTA RITA



CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

MARÇO LILÁS

O QUE É?



É um tumor (multiplicação anormal das células) que se desenvolve na parte inferior do útero chamada "colo", localizada no fundo da vagina.

P: O QUE CAUSA O CÂNCER DE COLO UTERINO?

Essa doença é causada, principalmente, pela infecção persistente por HPV (Papiloma Vírus Humano). A forma mais comum de transmissão desse vírus é durante a relação sexual.



Os tipos 16 e 18 do HPV são mais associados ao desenvolvimento do câncer.

FATORES DE RISCO



Início precoce da vida sexual



Múltiplos parceiros sexuais



Tabagismo



Imunidade baixa

O uso de preservativo (camisinha) contribui para reduzir a transmissão do HPV. Vale lembrar, entretanto, que a proteção não é total, pois a transmissão pode ocorrer pelo contato pele com pele.

SINAIS E SINTOMAS



Sangramento Vaginal Anormal



Dor durante a relação sexual



Corrimento Fétido

Na presença de qualquer desses sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima.

O TRIPÉ CITOLOGIA-COLPOSCOPIA-ANATOMOPATOLOGIA É NECESSÁRIO PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE COLO UTERINO